

اثر تمرین انعطاف‌پذیری و مصرف ویتامین B6 بر عالیم جسمی و روانی دیسمنوره اولیه دختران غیر ورزشکار

اسکندر رحیمی^۱، الهام متشرعی^{۱*}، نسرین اسدی^۲، محمد جعفری^۳، محمد رفعتی فرد^۴، مریم مهبدی^۱

^۱ گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس، شیراز، ایران، ^۲ گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران، ^۳ اداره کل آموزش و پرورش استان فارس، شیراز، ایران، ^۴ گروه ورزش و سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۰۲/۰۲

تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۱۰/۱۲

شماره ثبت در مرکز کارآزمایی های بالینی ایران: IRCT2013011412127N1

چکیده

زمینه و هدف: دیسمنوره اولیه یا قاعده‌گی دردناک یکی از شایع‌ترین شکایات در طب زنان است که با عالیم جسمی و روانی همراه می‌باشد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر ۸ هفته تمرین انعطاف‌پذیری و مصرف ویتامین B6 بر عالیم جسمی و روانی دیسمنوره اولیه در دختران غیر ورزشکار بود.

روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی تعداد ۶۰ دختر غیر ورزشکار، به صورت تصادفی در ۴ گروه مساوی؛ کنترل، تمرین، ویتامین و تمرین همراه با ویتامین قرار گرفتند. گروه تمرین در یک برنامه تمرینی انعطاف‌پذیری ۸ هفته‌ای شامل: کشش عضلات شکم، کمر، همسترینگ و نزدیک‌کنندهای ران شرکت کردند. آنها ۸ حرکت را به صورت هر حرکت با ۳ تکرار و هر تکرار به مدت ۱۰ ثانیه طی ۴ روز در هفته انجام دادند. گروه ویتامین به مدت هشت هفته از دو هفته قبل از قاعده‌گی تا سه روز بعد از قاعده‌گی روزانه دو عدد قرص ویتامین B6 ۴۰ میلی‌گرمی مصرف کردند. گروه تمرین همراه ویتامین ۸ هفته تمرین انعطاف‌پذیری و از دو هفته قبل از قاعده‌گی تا سه روز بعد از قاعده‌گی روزانه دو عدد قرص ویتامین B6 ۴۰ میلی‌گرمی استفاده کردند. گروه کنترل بدون مداخله بود. قبل و بعد از هشت هفته آزمودنی‌ها پرسشنامه اختلالات قاعده‌گی را پرکردند. داده‌ها با آزمون‌های ویلکاکسون، کروسکال والیس، یومان ویتنی به همراه اصلاحیه بنفرونی تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: کاهش معنی‌داری در میانگین عالیم جسمی گروه تمرین از ۲۸/۴ به ۲۸/۶، ویتامین از ۹/۳۵ به ۹/۴ و تمرین همراه با ویتامین از ۲۷/۶۶ به ۴/۴۰ و عالیم روانی گروه تمرین از ۲۵/۸۶ به ۵/۹۳، ویتامین از ۲۴/۹۹ به ۵/۵۲ و تمرین همراه با ویتامین از ۲۷/۷۳ به ۳/۳۶ بعد از ۸ هفته تمرین انعطاف‌پذیری و مصرف ویتامین B6 مشاهده شد، اما ابعاد جسمی و روانی در پس آزمون گروه تمرین همراه با ویتامین نسبت به گروه‌های دیگر کاهش بیشتری داشت ($p < 0.05$).

نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد، ۸ هفته تمرین انعطاف‌پذیری و مصرف ویتامین B6 منجر به کاهش عالیم جسمی و روانی دیسمنوره اولیه می‌شود.

واژه‌های کلیدی: دیسمنوره اولیه، تمرین انعطاف‌پذیری، ویتامین B6، دختران غیر ورزشکار

*نویسنده مسئول: الهام متشرعی، شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات فارس، گروه تربیت بدنی
Email:el.motesharee@gmail.com

مقدمه

موارد شدید شود به طوری که هر ماه حدود ۱۴ درصد دختران به علت انقباضات دردناک، از مدرسه غایب می‌کنند و کسانی هم که در محل کار حاضر می‌شوند چهار کاهش کارایی شدید می‌شوند(۷). در برخود با این مشکل روش‌های درمانی و تغذیه‌ایی مختلفی پیشنهاد شده است که از میان آن می‌توان به داروهای مهار کننده پروستاگلاندین‌ها، مسکن‌های ضد التهابی، قرص‌های جلوگیری از بارداری، روان درمانی و درمان‌های غیر دارویی برای بیمارانی که به دارو پاسخ نمی‌دهند یا از اثرات جانبی آن رنج می‌برند، تحت عنوان طب مکمل نام برد که شامل رژیم غذایی، ویتامین‌ها، فعالیت‌های بدنی و گیاهان دارویی است(۸ و ۹). با توجه به این که استفاده از مسکن‌ها و مصرف مداوم آنها در کوتاه مدت و یا دراز مدت اثرات و عوارض جانبی خاصی مانند؛ افسردگی، آسیب‌های عصبی، تحریک‌پذیری، التهاب و غیره را در بر دارد(۱۰). لذا با توجه به عوارض فراوان این داروها باید به دنبال راههای درمان بی‌خطرتری بود. نتایج حاصل از تحقیقات نشان می‌دهد که ورزش باعث بهتر شدن ناراحتی‌های ناشی از دیسمنوره می‌شود. به نظر می‌رسد که تمرینات ورزشی به عنوان یک ضد درد غیر اختصاصی عمل می‌کند(۱۱ و ۱۲). تحقیقات زیادی در رسالهای اخیر رابطه بین دیسمنوره و فعالیت‌های منظم ورزشی را مورد تأیید قرارداده‌اند. در تحقیقی که به وسیله سعادت آبادی و همکاران(۲۰۰۲) انجام

دیسمنوره یا قاعده‌گی دردناک یکی از شایع‌ترین مشکلات در زنان است که به دو نوع اولیه و ثانویه تقسیم می‌شود. در دیسمنوره اولیه درد همگام یا چند ساعت قبل از شروع قاعده‌گی آغاز و به مدت ۱۲ تا ۷۲ ساعت به طول می‌انجامد و مشابه دردهای زایمانی همراه با کرامپ‌های فوق عانه‌ای می‌باشد(۱). دیسمنوره ثانویه دردی است که با علت ارگانیک لگنی و یا غیرلگنی ایجاد می‌شود(۲). دیسمنوره اولیه با نشانه‌هایی از درد زیاد در ناحیه پایین شکم که ممکن است به پشت و بالای ران هم سرایت کند شناخته می‌شود و با آغاز قاعده‌گی شروع و از چند ساعت تا ۳ روز ادامه خواهد داشت(۳ و ۴). طیف وسیعی از تغییرات رفتاری در این دوران افزایش می‌یابد که شامل دو دسته علائم جسمانی و روانی است و با نشانه‌هایی مانند؛ افسردگی، عصبانیت، خواب آلودگی، بی‌توجهی و بی‌حوالگی، سردرد و یا اختلالات گوارشی مانند اسهال، تهوع و استفراغ و بی‌اشتهاای همراه است(۵). به طور کلی عوامل ایجاد کننده دیسمنوره شامل؛ عوامل روانی، عوامل غدد درون‌رین، عوامل مربوط به دهانه رحم، عوامل غیرطبیعی رحمی، ساخت و ترشح بیش از حد پروستاگلاندین‌ها می‌باشد(۶). گرچه دیسمنوره اولیه تهدید کننده زندگی فرد نمی‌باشد و سبب نقص عضو نمی‌گردد، ولی می‌تواند کیفیت زندگی زنان را تحت تأثیر قرار داده و سبب ناتوانایی و عدم کارایی در

وتحقیقات فارس و اخذ رضایت کتبی از شرکت
کنندگان انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل
دختر غیرورزشکار شهرستان مرودشت با دامنه سنی
۱۶-۱۸ سال بود که بر اساس فرمول محاسبه حجم
نمونه تعداد ۶۰ نفر داوطلب به صورت تصادفی به
عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

جهت انتخاب نمونه های لازم پژوهش ابتدا طی
جلسه ای داوطلبان شرکت در این تحقیق با نوع، اهداف
و روش اجرا آشنا شدند. در پایان جلسه آزمودنی ها
رضایت نامه شرکت در طرح و دو پرسشنامه اطلاعات
فردی شامل؛ سئوالاتی درباره سن، قد، وزن، سن
اولین قاعده‌گی، انجام فعالیت های ورزشی، مصرف
مسکن در حین دیسمنوره، طول دوره قاعده‌گی (بین ۳۰-
۲۸ روز)، نظم سیکل قاعده‌گی و مقیاس سنجش بصری
درد، به هر آزمودنی داده شد و از آنها خواسته شد تا
در اولین و دومین سیکل قاعده‌گی خود به سئوالات
پرسشنامه پاسخ دهند. مقیاس سنجش بصری
درد^(۱) (VAS) خطی به طول ۱۰ سانتی متر است که با
استفاده از آن از فرد خواسته می شود تا میزان درد
خود را از نقطه صفر(بدون درد) تا نقطه ۱۰ (درد غیر
قابل تحمل) بر روی آن مشخص کند. کسانی که بر
اساس خطکش درد امتیاز ۴ تا ۷ گرفتند دیسمنوره
متوسط و کسانی که امتیاز بین ۷ تا ۱۰ گرفتند
دیسمنوره شدید در نظر گرفته شدند. افرادی که شدت
درد آنها کمتر از ۴ بود در این پژوهش شرکت داده

شد، پیشنهاد شد که زنان مبتلا به دیسمنوره با
انقباض لیگامنت های شکمی مواجه هستند به این
ترتیب یک سری تمرينات کششی و مداوم را به آنها
توصیه کردند و دیده شد که این تمرينات در کاهش
شدید علایم دیسمنوره نقش برجسته ای داشتند^(۱۳).
استفاده از مکمل های ویتامینی نیز یکی از روش های
پیشنهادی است و استفاده از آنها بی خطر، مطمئن و
کم هزینه و در دسترس می باشد. یکی از این
ویتامین ها پیریدوکسین است، که اخیراً در تحقیقات
چندی به ارتباط بین مصرف این ویتامین و درمان
دردهای قاعده‌گی و علایم آن توجه زیادی شده
است^(۱۴). در مطالعه ای که به وسیله مرته و
همکاران^(۲۰۰۸) انجام گرفت اعلام شد که ویتامین B6
باعث بهبود سردرد و اضطراب در دیسمنوره اولیه
می گردد^(۱۵).

باتوجه به این که دیسمنوره ترکیبی از عوامل
فیزیولوژیکی و روانی است^(۱)، تاکنون پژوهش های
اندکی ترکیب ویتامین B6 و تمرينات انعطاف پذیری را
مورد توجه قرار داده اند، لذا مطالعه حاضر با هدف
تعیین تأثیر تمرينات انعطاف پذیری و مصرف
ویتامین B6 بر دیسمنوره در دختران غیرورزشکار
انجام شد.

روش بررسی

این مطالعه کارآزمایی بالینی پس از تأیید
کمیته اخلاق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم

با نظر پزشک مصرف ویتامین B6 را به صورت روزانه ۲ عدد قرص ۴۰ میلی‌گرمی از فاز دوم قاعده‌گی تا ۲ روز بعد از شروع قاعده‌گی آغاز کردند. گروه تمرین همراه با ویتامین نیز طبق پروتکل گروه تمرین و ویتامین عمل کردند. برای افراد گروه کنترل هیچ مداخله‌ای انجام نشد. پس از هشت هفته آزمودنی‌ها دومین پرسشنامه اختلالات قاعده‌گی را پر کردند و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این نکته قابل ذکر می‌باشد که اغلب مطالعات نشان داده که حداقل مدت زمان جهت اثر گذاری تمرینات ورزشی شش تا هشت هفته می‌باشد، از این رو مدت زمان دوره تحقیق در مطالعه حاضر هشت هفته انتخاب شده است(۱۳).

حرکات ورزشی شامل ۸ نوع تمرین

انعطاف‌پذیری بود که به افراد آموزش داده شد و مربوط به عضلات ران، نشیمنگاه، شکم و کمر می‌باشد. از آزمودنی‌های گروه‌های تمرین و تمرین + ویتامین B6 خواسته شد به صورت زیر عمل کنند:

- ۱- روی زمین با بدنی کشیده به شکم دراز بکشید، کف دست‌ها را در اطراف لگن روی زمین قرار دهید، بازدم کنید و به طرف زمین فشار دهید تنه را بلند کنید و یک قوس ایجاد کنید. حالت کششی را نگه داشته و سپس استراحت کنید. ۲- ایستاده پاها را در حدود ۶۰ تا ۹۰ سانتی‌متر از هم جدا کنید، دست‌ها را روی لگن قرار دهید، به آرامی قوسی در پشت ایجاد نمایید. کفل‌ها را منقبض نمایید و لگن را به جلو فشار دهید. ۳- به حالت دو زانو نشسته، کف دست‌ها را

نشدند. از بین این افراد، تعداد ۶۰ نفر که سابقه دیسمنوره اولیه داشته مشروط بر این که؛ ورزشکار نباشد، سابقه بیماری‌های التهابی لگن، فیبروم، تومور و کیست پس از معاینه پزشک نداشته باشند، مجرد باشند، مبتلا به هیچ‌گونه بیماری مزمن شناخته شده نباشند و عوامل استرس‌زا مانند جدایی والدین، فوت بستگان درجه یک در شش ماه اخیر نداشته باشند، جهت شرکت در برنامه تمرین انتخاب شدند.

نمونه‌ها به صورت تصادفی در گروه‌های مساوی؛ کنترل، تمرین، ویتامین و تمرین - ویتامین قرار گرفتند و اولین پرسشنامه اختلالات قاعده‌گی موس فرم T، که شامل ۲۲ عالیم جسمی و روانی دیسمنوره است(۱۴) سوال مربوط به نشانه‌های روانی و ۱۰ سوال مربوط به نشانه‌های جسمانی) و با درجات ندارم(صفراً امتیاز)، خفیف(۱ امتیاز)، متوسط(۲ امتیاز)، شدید(۳ امتیاز) و بسیار شدید(۴ امتیاز)، تقسیم بندی شده است در اختیار گروه‌های پژوهش قرار گرفت تا بر اساس عالیم دوران قاعده‌گی خود پر کنند. سپس برنامه زمانی تحقیق به وسیله فرمی در اختیار آزمودنی‌ها قرار گرفت. آزمودنی‌های گروه تمرین(به جز دوره قاعده‌گی) به مدت ۸ هفته، ۴ روز در هفته، ۸ حرکت مورد نظر را با ۳ تکرار ۱۰ ثانیه‌ای انجام دادند. بعضی حرکات در چند جهت مختلف انجام می‌گرفت. با در نظر گرفتن این جهات در کل ۱۸ حرکت انجام می‌دادند و هر هفتة ۱ ثانیه به مدت کشش اضافه می‌شد. آزمودنی‌های گروه ویتامین

داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های آماری کروسکال والیس و یومان ویتنی همراه با اصلاحیه بنفرونی و ویلکاکسون تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها

بر اساس نتایج حاصله آزمودنی‌های گروه‌های مختلف شرکت کنندگان در مطالعه از نظر خصوصیات دموگرافیک؛ سن، قد و وزن با هم هم‌بوده و تفاوت معنی‌داری نداشتند($p > 0.05$) (جدول ۱). نتایج مطالعه نشان داد، هشت هفته تمرین انعطاف‌پذیری و مصرف ویتامین^B در گروه‌های تمرین، ویتامین و تمرین همراه با ویتامین منجر به کاهش معنی‌دار ابعاد جسمی و روانی شد ($p = 0.001$) (جدول ۲). بر اساس نتایج حاصله، تفاوت معنی‌داری در تغییرات ابعاد جسمی گروه‌های تحقیق وجود داشت ($p = 0.001$)، به طوری که میزان کاهش ابعاد جسمی در گروه‌های تمرین، ویتامین و تمرین ویتامین به طور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل بود ($p = 0.001$). همچنین در گروه ویتامین تمرین بیشتر از گروه تمرین بود ($p = 0.001$). همچنین تفاوت معنی‌داری در تغییرات ابعاد روانی گروه‌های شرکت کننده وجود داشت، به طوری که میزان کاهش ابعاد جسمی در گروه‌های تمرین، ویتامین و تمرین ویتامین به طور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل بود ($p = 0.001$) و در گروه ویتامین تمرین بیشتر از گروه تمرین بود ($p = 0.001$).

روی زمین و موادی با انگشتان پا قرار دهید به زمین فشار دهید، بالا تنہ را به سمت عقب خم کنید تا عضلات شکم به کشش در آید. ۴- تمرین قبل را در حالی انجام دهید که ابتدا دست راست را کشیده در امتداد گوش‌ها قرار دهید و به عقب خم شوید. حالت کشش را نگه داشته و سپس همین حرکت را با دست چپ انجام دهید. ۵- با پاها کشیده به پشت دراز بکشید، یک زانو را خم کرده و آن را به طرف سینه بالا بیاورید، زانو را با یک دست بگیرید و آن را در عرض بدنتان به سمت زمین بکشید. آرنج‌ها و سر شانه را هم سطح زمین نگه دارید، کشش را نگه داشته و همین حرکت را با زانوی مخالف نیز انجام دهید. ۶- به حالت قائم بایستید، دست‌ها را در طرفین قرار دهید، پای چپ را پشت پای راست قرار دهید، تنہ را به آرامی به پهلوی راست خم کنید و سعی کنید که پاشنه پای چپ با دست‌ها تماس یابد، کشش را نگه داشته و همین حرکت را به سمت مخالف انجام دهید. ۷- به حالت قائم روی زمین بنشینید، زانوها را خم کرده و کف هر دو پا را به هم بچسبانید و آنها را به طرف نشینگاه بکشید. آرنج‌ها را در قسمت داخلی از بالای ران‌ها قرار دهید و به آرامی پاها را به زمین فشار دهید. ۸- بایستید و یک دست را جهت حمایت و تعادل در مقابل دیوار قرار دهید، از پشت یک پا را خم کرده و آن را به سمت نشینگاه بالا بیاورید این حرکت را برای پای بعد انجام دهید.

جدول ۱: مقایسه میانگین و انحراف معیار خصوصیات دموگرافیک گروه‌های شرکت کننده در مطالعه

متغیر	وزن(کیلوگرم)	۵۰/۳±۷/۹	۵۲/۵±۶/۸	۱۶۲/۷±۴/۷	۱۵۸/۶±۵/۲	۱۵۹/۱±۴/۶	۱۶/۹±۰/۷	>۰/۰۵	س سن(سال)
گروه	قد(سانتی متر)	۱۵۸/۵±۶/۹	۱۶۸±۰/۷	۱۶/۷±۰/۸	۱۷±۰/۸	۱۵۸/۶±۵/۲	۱۵۹/۱±۴/۶	۰/۰۵	ویتمین
کنترل	تمرین	س طح معنی‌داری	ویتمین	تمرین	س طح معنی‌داری	ویتمین	تمرین	ویتمین	س
س سن(سال)	قد(سانتی متر)	وزن(کیلوگرم)	ویتمین	تمرین	س طح معنی‌داری	ویتمین	تمرین	ویتمین	کنترل

جدول ۲: مقایسه میانگین نمرات تغییرات ابعاد جسمی و روانی در گروه‌های مورد مطالعه در مرحله پیش آزمون و پس آزمون

گروه	ابعاد جسمی	میانگین رتبه پیش آزمون	آماره Z	س طح معنی‌داری
کنترل؛	ابعاد جسمی	۲۹/۵۳	-۳/۴۹*	۰/۰۰۱
ابعاد روانی	۲۵/۲	۲۶/۶	-۳/۵۰*	۰/۰۰۱
ابعاد جسمی؛ تمرین؛	۲۸/۴	۶/۷	۷/۷*	۰/۰۰۱
ابعاد روانی	۲۵/۸۶	۵/۹۳	-۳/۴۱*	۰/۰۰۱
ویتمین؛	۲۵	۹/۳۵	۹/۳۵*	۰/۰۰۱
ابعاد روانی	۲۴/۹۹	۲/۵۳	-۳/۴۱*	۰/۰۰۱
ویتمین تمرین؛	۲۷/۶۶	۴/۴۰	۴/۴۰*	۰/۰۰۱
ابعاد روانی	۲۷/۷۳	۳/۳۶	-۳/۴۱*	۰/۰۰۱

ناشی از دیسمنوره را کاهش داد. با توجه به مشکلات

ناشی از دیسمنوره راههای متفاوتی نظری درمان‌های دارویی و درمان‌های غیر دارویی پیشنهاد شده است. اما در این بین درمان غیر دارویی مانند فعالیت ورزشی و تجویز مکمل غذایی از جمله ویتامین‌ها به جهت اینکه عوارض جانبی به همراه ندارد و مصرف آن بی‌خطر، مطمئن، کم هزینه و در دسترس است، مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر تمرینات انعطاف‌پذیری و مصرف ویتامین B₆ بر دیسمنوره اولیه در دختران غیر ورزشکار انجام شد.

نتایج این مطالعه نشان داد که علایم جسمی و روانی دیسمنوره با انجام تمرینات انعطاف‌پذیری و مصرف ویتامین B₆ بهبود می‌یابد. یافته‌های این پژوهش مشابه با نتایج دیگر مطالعات انجام شده در

بحث
در دیسمنوره اولیه رحم به دلیل کاهش ذخایر خونی خود دچار اسپاسم می‌شود. تصور می‌شود که آزاد شدن پروستاگلاندین‌ها و دیگر میانجی‌های التهابی در رحم اصلی‌ترین عامل ایجاد دیسمنوره اولیه باشد. این امر منجر به تولید درد با ماهیت انقباضی می‌شود. این مسئله از عوامل تشدید کننده درد در دیسمنوره محسوب می‌شود. افزایش پروستاگلاندین‌ها در افراد مبتلا به دیسمنوره شدیدتر بوده و این مسئله موجب انقباض عروق و عضلات رحمی می‌شود که در نهایت با ایسکمی رحمی و در نتیجه درد همراه خواهد بود(۱۶). تغییرات رفتاری بسیاری در این دوران افزایش می‌یابد که با علایم جسمانی و روانی همراه است(۱۷). بنابراین باید به دنبال روش‌هایی بود که بتوان علایم جسمی و روانی

تحریک هورمون‌های کورتیزول، اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین، آلدسترون و آرتوکورتیکوتروپین و از طریق تأثیر بر روی سیستم عصبی سمباتیک باعث بدتر شدن وضعیت قاعده‌گی می‌شوند. ورزش و فعالیت‌های بدنی یکی از راه‌های کاهش استرس است که به بهبود گردش خون و افزایش اندروفین و انتقال دهنده‌های عصبی کمک می‌کند که این مواد آستانه درد را بالا برده و از طریق کاهش فعالیت سیستم سمباتیک، می‌تواند منجر به کاهش نشانه‌های دیسمنوره گردد(۲۰).

متتی و اسمیت (۱۹۸۹)، در پژوهش خود عنوان کردند که فعالیت‌های ورزشی باعث افزایش علایم جسمی دیسمنوره می‌شود. وجود این تناظر شاید به دلیل نوع تمرین، مدت تمرین و گروه‌های متجانس باشد(۲۱). از جمله تحقیقات انجام شده در زمینه ارتباط مصرف ویتامین^۶_B بر دیسمنوره که با تحقیق حاضر همخوانی دارد می‌توان به مطالعه سخاوت و همکاران (۲۰۰۸) اشاره کرد. آنان در مطالعه‌ای اثر ویتامین^۶_B را در درمان علایم گوارشی دیسمنوره اولیه دختران بررسی کردند. یافته‌ها حاکی از آن است که ویتامین^۶_B باعث کاهش تهوع هنگام قاعده‌گی شد(۲۲). کاشانیان (۲۰۰۷) با هدف تأثیر ویتامین^۶_B در درمان علایم روانی و جسمانی سندروم پیش از قاعده‌گی مطالعه‌ای را انجام داد و به این نتیجه رسید که ویتامین^۶_B تأثیر معنی‌داری بر این علایم دارد(۱۴). هادسون و همکاران (۲۰۰۷)، بر این باورند که استقراغ‌های درران قاعده‌گی منشاء خلقی دارد و

رباطه با تأثیر ورزش و مصرف ویتامین بر دیسمنوره است. در تحقیقی که به وسیله چیو و همکاران (۲۰۰۴) طی ۲۰ هفته تمرین بر روی زنانی که مشکل دیسمنوره اولیه داشتند انجام گرفت، اعلام شد که شرکت در فعالیت‌های ورزشی در کاهش عالیم دیسمنوره مؤثر بوده است. نتایج این تحقیق بیانگر این است که انجام ورزش در دراز مدت سبب کاهش گرفتگی‌های عضلانی و بهبود خون‌رسانی به عضلات شده و عالیم جسمی دیسمنوره کاهش می‌یابد(۱۸). سعادت آبادی و همکاران (۲۰۰۲) تأثیر ۶ هفته تمرین انعطاف‌پذیری بر دیسمنوره را بررسی کردند، یافته‌ها نشان داد که تمرین انعطاف‌پذیری باعث کاهش معنی‌داری در عالیم جسمی و روانی دیسمنوره می‌گردد. طبق یافته‌های این محققان تأیید شد که تمرینات ورزشی با افزایش انعطاف عضلات شکم و لگن که در اطراف رحم قرار دارند، اسپاسم و انقباض‌پذیری این عضلات بهبود و در نتیجه درد کاهش می‌یابد. همچنین از طریق افزایش خون‌رسانی احتمال وجود ضعف و سرگیجه را کاهش می‌دهد(۱۳). همچنین نتایج مطالعه پریور و همکاران (۱۹۸۵)، نشان داد که تورم و دردناکی سینه، آشفتگی و استرس ناشی از قاعده‌گی در زنان بی تحرک، پس از ۶ ماه برنامه تمرینات ورزشی به طور معنی‌داری کاهش می‌یابد(۱۹). پژوهش انجام شده بیانگر این است که انجام منظم تمرینات ورزشی ترشح اندروفین را که خاصیت ضد درد دارد افزایش می‌دهد و این امر منجر به کاهش استرس می‌شود. استرس و فشار عصبی با

ضروری برای کنترل تبدیل تریپتوفان به سرتونین می‌باشد و به نظر می‌رسد، می‌تواند بر روی متابولیسم آمین‌های بیوژنیک تأثیرات زیادی داشته باشد(۲۷). فرنچ و همکاران(۲۰۰۵) در مورد مؤثر بودن ویتامین^۶ در درمان دیسمنوره نظر منفی دارند(۱۰). البته مطالعه‌ی وی در مورد بررسی و درمان دیسمنوره اولیه و ثانویه بود، در صورتی که دیسمنوره ثانویه ممکن است به علت ارگانیکی باشد که نیاز به درمان خاص خود دارد. همچنین مدت زمان و مقدار مصرف ویتامین^۶ نیز از نکات حایز اهمیت در درمان دیسمنوره است. مطالعه انجام شده بیانگر تأثیر مثبت تمرینات انعطاف‌پذیری بر عالیم دیسمنوره و اختلالات پیش از قاعده‌ی بوده است. همچنین با توجه به مطالعات انجام شده در خصوص مکانیسم عمل ویتامین^۶، مصرف این ویتامین می‌تواند تأثیر مثبتی بر کاهش عالیم دیسمنوره داشته باشد.

نتیجه‌گیری

در پژوهش حاضر یافته‌ها دال بر این مطلب است که تمرینات انعطاف‌پذیری منتخب و مصرف ویتامین^۶ باعث کاهش معنی‌داری در عالیم روانی مانند؛ گریه کردن، تحریک پذیری، خستگی، اجرای ضعیف در مدرسه و محل کار و عالیم جسمی مانند؛ تهوع و استفراغ، سردرد، کمردرد، دردناکی سینه، اسهال، نفخ و تورم شکم و افزایش اشتها در دیسمنوره می‌شود. بر اساس نتایج این پژوهش می‌توان زنان مبتلا به دیسمنوره اولیه را به سمت

دادن ویتامین^۶ با اثر بر روی عالیم خلقی می‌تواند باعث بهبود عالیم گوارشی هنگام قاعده‌ی شود(۲۳). این تحقیقات تأیید می‌کند که زمانی که ویتامین^۶ استفاده می‌شود، زنان دچار مشکلات قاعده‌ی کمتری می‌شوند. این تأثیر به دلیل نقش این ویتامین در تنظیمات هورمونی، عصبی و پروستاگلاندین‌ها می‌باشد(۲۴). ویتامین^۶ در فعالیت‌های مختلف بدن از جمله خون‌سازی، متابولیسم کربوهیدرات‌ها و فعالیت‌های سیستم عصبی مرکزی و سیستم عضلانی عصبی شرکت دارد و چون در فعالیت‌های عصبی و عضلانی نقش دارد، بنابراین بر روی عالیم دیسمنوره مؤثر است(۲۵). دوپامین و سرتونین نوعی انتقال دهنده‌های عصبی هستند که بر خلق و خو و اشتهای افراد تأثیر می‌گذارند. کمبود ویتامین^۶ سبب کاهش دوپامین در سطح کلیه‌ها و در نتیجه افزایش ترشح سدیم شده و سبب تجمع آب می‌گردد و به دنبال آن علایمی مانند ورم در انتهایها، ادم، درد سینه‌ها و ناراحتی در ناحیه شکم ایجاد می‌شود. ویتامین^۶، منیزیم و ویتامین^۷ در تولید دوپامین بسیار مؤثرند. بنابراین تجویز ویتامین^۶ می‌تواند سبب کاهش عالیم قاعده‌ی شود(۲۶). سرتونین، مهم‌ترین واسطه شیمیایی در مغز است که احساسات و رفتار را کنترل می‌کند. بی‌نظمی در میزان سرتونین عالیم گوناگونی مثل اضطراب، افسردگی، یا تحریک‌پذیری در فرد را به وجود می‌آورد. این عالیم همراه با نشانه‌های متعدد جسمانی مثل سر درد، کمر درد، احساس سنگینی و حساسیت پستان‌ها است. ویتامین^۶ یک عامل

استفاده از ورزش و تمرینات انعطاف‌پذیری و مصرف ویتامین₆ سوق داد. از مزایای این تمرینات می‌توان به سادگی، قابل اجرا بودن در هر مکان و با صرفه‌جویی مناسب در وقت، اشاره کرد. هم‌چنین استفاده از مکمل‌های ویتامینی یکی از روش‌های پیشنهادی است. به علاوه استفاده از آنها بی‌خطر، مطمئن، کم هزینه و در دسترس می‌باشد. با توجه به تأثیر تمرینات انعطاف‌پذیری بر دیسمنوره و نیز مکانیسم عمل ویتامین₆ به نظر می‌رسد، ترکیب این دو اثرات بهتری بر کاهش عالیم دردهای دوران قاعدگی داشته باشد و نتایج نیز حاکی از این است که ویتامین₆ و تمرینات انعطاف‌پذیری باعث کاهش علایم جسمی و روحی دیسمنوره می‌شود.

تقدیر و تشکر

این مطالعه حاصل پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش مصوب دانشگاه علوم و تحقیقات فارس بود. از تمامی آزمودنی‌ها و کسانی که ما را در انجام این پژوهش مساعدت نمودند، کمال تشکر را داریم.

REFERENCE

- 1.Akbarzade A. Women-Childbirth and Midwifery. 4th ed. Tehran: Pasha Publication; 2000; 67-72
- 2.Gharekhani P, Sadatiyan A. Cardinal manifestations and management of diseases of gynecological. Noore Danesh Publication 2004; 3: 72-5.
- 3.Lefebvre G ,Pinsonneault O. Primary dysmenorrhea consensus guideline. Sogc Clinical Practice Guideline 2005; 169:1117-29.
- 4.Daley AJ. Exercise and primary dysmenorrhoea:a comprehensive and Critical review of the literature. Sports Med 2008; 38(8): 659-70.
- 5.Banikarim C, Chacho MR, Kelder SH. prevalence and impact of dysmenorrhea on Hispanic female adolescent . Arch pediatr Adolesc Med 2000;154:1226-9.
- 6.Azgoli G, Goli M , Moatar F, Velaie N. Comparison between the effect of ginger and Mefenamic Acid in treatment of Dysmenorrhea. Medical Research 2007; 31(1): 61-5.
- 7.French L. Desmenorrhea in adolescent. AM Fam Physician 2005; 71(2): 258-91.
- 8.Berek JS, Adashi E, Hillard PA. Novaks Gynecology. 13th ed. USA Williams and Wilkins: Mosby Co; 2002; 421-39.
- 9.Ryan KJ, Berkowitz RS, Barbieri RL, Dunaif A. Kistner gynecology and womens health.Translated to Persian by: Ghazi Jahani B, Ghotbi R. Tehran: Golban pub; 2009; 62-5.
- 10.Stoddard JL , Dent CW, Shames L, Bernstein L. Exercise training effects on premenstrual distress and ovarian steroid hormones. Eur J Appl Physiol 2007; 99(1): 27-37.
- 11.Mastrangelo MA ,Galantion ML ,House L. Effects of yoga on quality of life and flexibility in menopausal women:a case series. Explore(NY) 2007; 3(1): 42-5.
- 12.Rumball JS, Lebrun CM. Preparticipation physical examination; selctted issues for the femal athleete. Clin J Sport Med 2004; 14(3): 153-60.
- 13.Sa'adat Abadi F, Bambaechehi E, Esfarjani F. The effect of 6 weeks of stretching exercises on primary dysmenorrhea. Esfahan Journal of Medical Sciences 2000; (109): 401-7.
- 14.Kashanian M. Pyridoxine therapy for premenstrual syndrome. Int Jgynaecolob- stet 2007; 96(1): 43-44.
- 15.Merete C, Falcon LM, Tucker KL. Vitamin B6 is associated with depressive symptomatology in massach usetts. J Am coll Nutr 2008; 27(3): 421-7.
- 16.Wright J, Wyatt S. The Washington manual obstetrics and gynecolo- logy survival guide. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkin 2003; 5(3), 123-136.
- 17-Banikarim C,Chacho MR ,Kelder H. prevalence and impact of dysmenorrhea on Hispanic female adolescents . Arch pediatrAdolesc Med 2000; 154, 1226-9.
- 18-Chio MH ,Wang HH. The relationship between dysmenorrhea and me- nstrual attitudes among female students invocational nursing schools.(article in Chinese) Hu Za ZHI,2004; 51(4), 45-52.
- 19-prior JC ,Vigna Y,Alojada N. Conditioning exercise decreases pre- menstrual symptoms. A Prospective controlled three m0nth trial,Eur J Applphysiol Occup physiol,1985; 55(4), 349-55.
- 20-William J ,Nicholas AR. Hormonal Responses andAdaptath-ons to Resistance Exercise and Training. Sports Med,2005; 35(4): 339-61.
- 21.Metheny W, Smith R. The relationsgip among exercise,stress and primary dysmenorrheal. Behave J Med1989; 12: 569-89.
- 22.Sekhavat L, Naqshi M. Effects of vitamin B6 in the treatment of primary dysmenorrhea symptoms of young girls in the city of Yazd. Yazd Journal of Medical Sciences 2008; 5: 25-9.
- 23.Hudson A. TUsin nutrition to relieve primory dysmenorrhea. altern - ativeand complementary. Therapies 2007; 13(3): 125-8.
- 24.Bender DA. Non-nutritional uses of vitamin B6. Br J Nutr 1999; 81(1): 7-20.
- 25.Abraham GH, Hargrove JT. Effect of vitamin B6 on premenstrual symptomato- logy in women with premenstrual tension syndrom. Adouble Blind Crossover Study1980; 228: 425-7.
- 26.Shin SH, Stirrling R. Ascorbic acid potentiates the inhibitory effect of dopam- ine On prolactin release in primary cultured rat pituitary cells. J Endocr 1988; 118: 287-94.
- 27.Doll H, Brown S. Pyridoxine and the premenstrual syndrom. J R Gen- eral practitioners 1989; 64-8.

Effects of Flexibility Exercise and Supplement Vitamin B6 on Primary Dysmenorrhea in Female Non-Athletes

Rahimi E¹, Motesharee E^{1*}, Asadi N², Jafari M³, rafati fard M⁴, Mehbodi M⁴

¹Department of Physical Education, Science and Research Branch, Islamic Azad University Fars, Shiraz, Iran, ²Department Obstetrics and Gynecology, Shiraz University of Medical sciences, shiraz, Iran, ³Department of Physical Education, Fars Education organization, shiraz, Iran, ⁴ Department Health and Sports, Shahid Sadoghi University of Medical sciences, Yazd, Iran

Received: 02 Jan 2013

Accepted: 23 Apr 2013

Abstract

Background & aim: Primary dysmenorrhea or painful menses in women's medicine is one of the most common complaints that are associated with physical and psychological symptoms. The aim of this investigation was to study the effects of an eight week flexibility exercise and use of vitamin B6 on physical and psychological symptoms of primary dysmenorrhea in non-athlete females.

Methods: In this clinical trial study, 60 non-athlete females, were randomly divided into 4 groups; control, exercise, vitamins and exercise plus vitamin. They engaged in an 8-week exercise program that includes flexibility training, stretching the abdominal muscles, lower back, hamstrings and pelvis and hip stretches. Eight movements, each movement with 3 times repetition and each repetition lasting 10 seconds during 4 days per week was performed. The vitamins group used 2 tablets of 40 miligaram B6 vitamin daily during the 8 week program starting 2 weeks before menstruation to 3 days after menstruation. In the exercise with vitamin group, during the 8 weeks of flexibility traininig program females used from 2 weeks before menstruation to 3 days after menstruation 2 tablets of 40 miligaram B6 vitamin daily. The control group had no intervention. Before and after eight weeks, participants completed the menstrual disorders' questionnaire. Data were analyzed.

Results: Significant decreases in average of physical symptoms(exercise from 28/4 to 6/7, vitamin from 25 to 9/35,training with vitamin from 27/66 to 4/40) and psychological symptoms (exercise 25/86 to 5/93, vitamin 24/99 to 3/53, training whith vitamin 27/73 to 3/36) was observed. But physical and psychological symptoms in post-test of exercise group with vitamin had a significant decrease as compared wih other groups ($p\leq 0/05$).

Conculusion: 8 weeks of flexibility and vitamin B6 usage may reduce the physical and psychological symptoms of dysmenorrhea.

Keywords: Dysmenorrhea primory, Flexibility exercise, Vitamin B6, Non-athlete girls

*Corresponding Author: Motesharee E, Department of Physical Education, Science and Research Branch, Islamic Azad University Fars, Shiraz, Iran
Email:El.motesharee@gmail.com