

مقایسه دو روش فیکسایشون لامهای خونی پاپ اسمیر به وسیله محلول کارنویز و اتیل الكل ۹۶ درصد در نمونههای تهیه شده از درمانگاههای زنان

چکیده:

مقدمه و هدف: سرطان رحم یکی از مشکلات مهم بهداشتی گسترده در دنیاست. تست پاپانیکولا شایع‌ترین ابزار مؤثر در دسترس برای تشخیص زودرس سرطان دهانه رحم است. خون می‌تواند اثرات منفی در کیفیت پاپ اسمیر داشته باشد. فیکسایشون خوب گلbulوهای قرمز را از زمینه لامهای خونی کاهش می‌دهد و می‌تواند این تکنیک را بهبود بخشند. یکی از محلولهای مؤثر برای لیز کردن گلbulوهای قرمز محلول کارنویز می‌باشد. هدف از این مطالعه مقایسه دو روش فیکسایشون لامهای خونی پاپ اسمیر به وسیله محلول کارنویز و اتیل الكل ۹۶ درصد در نمونههای تهیه شده از درمانگاههای زنان بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه یک پژوهش تجربی روی ۴۵۰ لام خونی پاپ اسمیر تهیه شده از دهانه رحم ۲۲۵ زن که برای غربالگری سالانه سرطان دهانه رحم در سالهای ۱۳۸۴-۱۳۸۵ به بیمارستانهای زینبیه و شهید فقیهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز مراجعه و خونریزی تماسی داشتند انجام گرفت. از هر نمونه بعد از مشاهده خونریزی تماسی دو نمونه به روش مرسوم پاپ اسمیر تهیه شد: در روش اول یکی از لامهای به وسیله اتیل الكل ۹۶ درصد به مدت ۵ دقیقه فیکس شد و در روش دوم لام بعدی به وسیله محلول کارنویز به مدت ۲۰ دقیقه فیکس گردید. سپس لامهای روش پاپانیکولا رنگ‌آمیزی شدند و به وسیله دو نفر پاتولوژیست به صورت دو سو کور مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌های جمع‌آوری شده به وسیله نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های آماری فیشر، مجدور کای و تی مستقل آنالیز گردیدند.

یافته‌ها: از بین ۴۵۰ نمونه تهیه شده ۴۱۰ نمونه دارای کفایت سلولی لازم برای مطالعه بودند. نتایج نشان داد که حضور سلولهای سنگفرشی و استوانه‌ای در لامهای کارنویز فیکس بیشتر از لامهای اتیل الكل فیکس بود. کاهش گلbulوهای قرمز از زمینه لامهای افزایش ووضوح لامهای نمونه‌های کارنویز فیکس بیشتر از لامهای الكل فیکس بود. تشخیص سلولهای التهابی و عوامل بیماری‌زا در لامهای کارنویز فیکس بیشتر از لامهای الكل فیکس بوده است ($P < 0.001$). اما تشخیص سلولهای سنگفرشی و استوانه‌ای غیر طبیعی در دو روش، اختلاف آماری معنی‌داری را نشان نداد.

نتیجه‌گیری: محلول کارنویز می‌تواند به عنوان یک فیکساتیو مؤثر در نمونههای خونی پاپ اسمیر به روش مرسوم مورد استفاده قرار گیرد.

واژه‌های کلیدی: فیکسایشون، محلول کارنویز، اتیل الكل ۹۶ درصد، پاپ اسمیر

خدیجه ابدالی *

مهری شمسی **

دکتر نادر ریاض منظر ***

سید حمیدرضا طباطبایی ****

* کارشناس ارشد مامایی، مرتبی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)، گروه مامایی

** کارشناس ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‌آباد بیمارستان زنان و زایمان، بخش زنان

*** متخصص پاتولوژی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده پزشکی، بخش پاتولوژی **** کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، مرتبی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده بهداشت، گروه آمار حیاتی

تاریخ وصول: ۱۳۸۵/۹/۷

تاریخ پذیرش: ۱۳۸۵/۱۲/۶

مؤلف مسئول: خدیجه ابدالی

پست الکترونیک: abdali_kh@yahoo.com

مقدمه

تهیه شده از سلول‌های گردن رحم بر روی کیفیت و نتایج اسمری تأثیر منفی می‌گذارد(۷).

در مطالعه‌ای که به وسیله کدیور و همکاران(۱۳۸۲) در شهر شیراز جهت بررسی غربالگری پاپاسمری در شبکه بهداشتی استان فارس انجام شد حضور خون در لام‌های پاپاسمر قابل ملاحظه بود به گونه‌ای که ۸۵ درصد لام‌ها دارای آغشتنگی اندک تا متوسط ۳ تا ۷ درصد لام‌ها پوشیده از خون بوده‌اند و ناهنجاری‌های سلولی لام‌های خونی بیشتر بود که می‌تواند بیانگر آسیب‌پذیر بودن گردن رحم و خونریزی متعاقب برخورد ابزار نمونه‌گیری به دلیل در معرض خطر بودن این سلول‌ها به سرطان گردن رحم باشد(۸). در بررسی نتایج غیر طبیعی پاپاسمری در مراجعین به مراکز درمانی- بهداشتی استان اصفهان در ۲۲ درصد از موارد ارجاع شده خونریزی بعد از تماس جنسی و خونریزی متعاقب نمونه‌گیری وجود داشت که از این میزان ۱۱ درصد به همراه پاسخ غیرطبیعی نئوپلازی داخل اپیتلیوم گردن رحم دو^(۹) وجود داشت(۹). در تهران آلودگی لام‌ها به خون در بررسی ۳۰۰۰ نمونه پاپاسمری در زنان متأهل ۱۲ درصد گزارش شده است که مشاهده خون در پاپاسمری ۵/۳ درصد شناس شناس ابتلا به دیسپلازی را افزایش داده است(۱۰). در مطالعه‌ای که به وسیله هایدشین و

سرطان گردن رحم یکی از مشکلات مهم بهداشتی در اکثر کشورهای است و حتی می‌توان از آن به عنوان یک مشکل جهانی یاد کرد. سرطان گردن رحم، سومین سرطان شایع در زنان می‌باشد که منجر به مرگ بسیاری از زنان در کشورهای در حال توسعه می‌گردد(۱). میزان شیوع این سرطان در کشور ایران ۵/۵ درصد می‌باشد. سرطان گردن رحم عوامل خطر متعددی از جمله؛ سن پایین در زمان اولین نزدیکی جنسی، شرکای جنسی متعدد، مصرف سیگار، نژاد، تعداد زایمان بالا، پایین بودن سطح اقتصادی اجتماعی، عفونت دهانه رحم با ویروس پاپیلومای انسانی^(۱) و غیره دارد. علایم سرطان به صورت خونریزی نامنظم از واژن، خونریزی متعاقب مقارتی یا هردو، خونریزی تماسی در اثر تهیه نمونه از گردن رحم و غیره می‌باشد(۲). تست پاپانیکولا یکی از مؤثرترین ابزار در دسترس برای تشخیص زودرس این سرطان می‌باشد(۳). از سال ۱۹۵۰ این تست موجب کاهش شیوع این سرطان تا حدود ۷۹ درصد و ۷۰ کاهش مرگ و میر ناشی از این سرطان تا حدود ۱۲ درصد بوده است(۴). تغییر در فن آوری تست پاپاسمری ضروری می‌باشد. نتایج منفی کاذب به علت اشتباه در نمونه‌گیری، تفسیر، تهیه لام، فیکساسيون نامناسب، خشک شدن نمونه در هوا، پوشیده بودن سطح لام به وسیله موکوس، ترشحات و خون به وقوع می‌پیوندد(۶ و ۵). وجود خون بر روی گستره

1-Human Papillomavirus
2-Cervical Intra Epithelial Neoplasia2 (CIN2)
1-Hideshein et al

گردن رحم تاکنون از آن استفاده نشده است. هدف از این مطالعه مقایسه دو روش فیکساسیون لامهای خونی پاپ اسمیر به وسیله محلول کارنویز و اتیل الكل ۹۶ درصد در نمونه‌های تهیه شده از درمانگاه‌های زنان است.

مواد و روش‌ها

این پژوهش یک مطالعه تجربی می‌باشد که در فاصله زمانی سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۸۵ در درمانگاه‌های بیماری‌های زنان بیمارستان‌های زینبیه و شهید فقیهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شده است. این پژوهش بر روی ۴۵۰ لام خونی تهیه شده از سلول‌های گردن رحم ۲۲۵ زن مراجعه کننده جهت غربالگری سالیانه پاپ اسمیر که در هنگام نمونه‌گیری، خونریزی تماسی داشته‌اند، انجام شده است. این حجم نمونه با توجه به درصد خون باقیمانده روی لام‌ها در روش الكل‌فیکس و کارنویز فیکس با اختلاف ۴ درصد بین دو روش و انحراف معیار ۱۴ و نیز در دو روش بر روی یک نمونه لام و ضریب اطمینان ۵ درصد و توان آزمون ۸۰ درصد و با روش محاسبه حجم نمونه برای دو میانگین در حالت جورشده تعیین شده است. مشخصات واحدهای مورد پژوهش شامل؛ کلیه لامهای تهیه شده از سلول‌های گردن رحم که در هنگام نمونه‌گیری خونی شدند، سلول‌های به دست آمده از گردن رحم به طور یکنواخت و نازک بر روی

همکاران^(۲) (۱۹۹۸) در آمریکا جهت بررسی ایمونولوژیک سلول‌های گردن رحم با استفاده از پاپ اسمیر انجام شد، آغشته بودن لام‌ها به خون موجب کاهش قدرت تشخیصی آزمایش‌ها شد و یافتن راه حلی جهت پاک نمودن خون از نمونه‌ها برای جلوگیری از تکرار پاپ اسمیر و هزینه‌های مربوط به آن را پیشنهاد می‌دهد^(۱).

با توجه به مسائل فوق وجود نمونه‌های خونی پاپ اسمیر به عنوان یکی از چالشهای مهم سیتوولوژیک است. فیکساسیون یکی از مهمترین جنبه‌های بافت‌شناسی می‌باشد و یکی از مراحل اساسی در تهیه نمونه‌های بافت‌شناسی و تشخیص آنهاست. از محلول‌های مختلفی جهت فیکساسیون و پاکنمودن خون از نمونه‌های پاپ اسمیر استفاده می‌شود، مانند؛ اسید استیک، محیط مایع^(۱)، سیتوریچ - رد^(۲) که هر کدام دارای معایب خاص خود از جمله؛ کاهش وضعی سلولی، ایجاد لخته‌شدن به وسیله سلول‌های خونی که موجب مسدود شدن فیلتر دستگاه سانتریفوژ^(۲) می‌شود و همچنین قیمت بالای آنها می‌باشد. یکی از محلول‌های مؤثر در همولیز گلبول‌های قرمز محلول کارنویز (اتانول، کلروفرم، اسید استیک ۱، ۶:۳)^(۳) است (۸). فیکساتیو کارنویز می‌تواند جهت پاکنمودن خون از نمونه‌های پاپ اسمیر قبل از رنگ‌آمیزی نمونه جهت بررسی بهتر مورد استفاده قرار گیرد. در حال حاضر محلول کارنویز جهت فیکس گردن بافت‌های دیگر از جمله؛ بافت معده، مری، تیروئید، پستان و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد و در سیتوولوژی

1-Thin prep
2-Cytorich - red
3-Centrifuge

فیکس گردید و در بیمار بعدی نمونه اول به وسیله محلول کارنویز و نمونه دوم به وسیله اتیل الكل ۹۶ درصد فیکس گردید.

تعیین درصد خون لامها به وسیله پاتولوژیست و بر اساس مشاهده تعداد گلبول های قرمز در هر میدان دید میکروسکوپی انجام شد(۱۱). در این مطالعه میزان وضوح لامها با توجه به معیار درصد خونی بودن لام و کیفیت رنگ آمیزی هسته و سیتوپلاسم به صورت زیر دسته بندی شد؛ درصد خونی بودن لام، میزان وضوح خوب (۴۰ - ۰) درصد، متوسط (۷۰ - ۴۰) درصد و بد (۱۰۰ - ۷۰) درصد بود. رنگ آمیزی هسته ای و سیتوپلاسم میزان وضوح خوب (رنگ آمیزی مناسب) و متوسط (رنگ آمیزی ضعیف / مناسب) و بد (رنگ آمیزی هسته و سیتوپلاسم میزان هر دو ضعیف) بود(۱۱ و ۸).

سپس نمونه های تهیه شده به روش پاپانیکولا رنگ آمیزی شدند و به صورت دو سو کور به وسیله دو سیتوولوژیست مطالعه شده و نتایج آنها در فرمی که بدین جهت تهیه شده بود ثبت گردیدند.

اطلاعات به دست آمده با نرم افزار SPSS^(۱) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. ابتدا مشخصات افراد مراجعه کننده در روش اول و دوم بر اساس فرم داده ها با یکدیگر مقایسه شدند و سپس نتایج حاصل از مطالعه لام های کارنویز و اتیل الكل در دو روش

یک اسلاید شیشه ای کشیده شدند و نمونه ها بلا فاصله در محلول کارنویز و الكل جهت ثابت شدن قرار داده شدند. در این مطالعه زنانی با مشخصاتی شامل؛ زنان مراجعه کننده حداقل یکبار ازدواج کرده اند، ۲۴ ساعت قبل از دوش واژینال و یا هر نوع لوبریکانت استفاده نکرده بودند، ۲۴ ساعت قبل نزدیکی نداشتند و از کرم واژینال به مدت یک هفته استفاده نکرده اند، وارد پژوهش شدند و در غیر این صورت نمونه ها از مطالعه حذف شدند.

از هر نمونه رضایت نامه کتبی و آگاهانه جهت شرکت در این مطالعه اخذ شد. سپس پرسشنامه حاوی اطلاعات عمومی، نتایج آزمایش های قبلی پاپ اسمیر در صورت انجام، گزارش مشاهدات فرد نمونه گیر و گزارش متخصص سلول شناسی تکمیل شد. بیمار در وضعیت لیتاتومی خوابانده شد و اسپاکولوم به آرامی وارد واژن گردید. از هیچ وسیله ای به جز آب گرم جهت داخل کردن اسپاکولوم استفاده نشد. وضعیت سرویکس و واژن به دقت بررسی شد. پس از مشاهده خونریزی تعاسی در اثر برخورد ابزار نمونه گیری، از هر فرد دو نمونه پاپ اسمیر، به روش مرسوم تهیه شد، سپس یکی از نمونه ها به مدت ۵ دقیقه به وسیله اتیل الكل ۹۶ درصد و نمونه دیگر به مدت ۲۰ دقیقه به وسیله محلول کارنویز فیکس گردیدند. جهت جلوگیری از تورش نمونه ها به صورت ضربدری تهیه شدند. بدین ترتیب که در بیمار اول؛ نمونه اول به وسیله اتیل الكل ۹۶ درصد و نمونه دوم به وسیله محلول کارنویز

درصد خون لامهای دو روشن بر اساس مشاهده تعداد گلوبول‌های قرمز در هر میدان دید میکروسکوپی تعیین شد. با استفاده از آزمون آماری تی مستقل بین میانگین درصد خونی بودن لامهای دو روشن اختلاف آماری معنی دار است. میانگین آلودگی لامها به خون در لامهای الكل فیکس ۴۹/۹ درصد و در لامهای کارنویز به ۱۲/۳۸ درصد کاهش یافت ($p < 0.001$) (تصاویر ۱ و ۲). میزان وضوح لامهای کارنویز فیکس در مقایسه با لامهای الكل فیکس بیشتر بود ($p < 0.001$) (جدول ۱).

در این پژوهش بین شناسایی سلول‌های التهابی و ارگانیسم‌های بیماری‌زا در دو روشن اختلاف معنی‌داری مشاهده شد. شناسایی سلول‌های التهابی در لامهای کارنویز ۴۴/۹ درصد در مقایسه با لامهای الكل فیکس ۳۱/۲ درصد است ($p < 0.05$). شناسایی عوامل میکروبی در لامهای کارنویز فیکس درصد و در لامهای الكل فیکس ۲۴/۹ درصد بوده است ($p < 0.001$). در این مطالعه هیچ اختلافی بین طبقه‌بندی عمومی ناهنجاری‌ها و حضور ناهنجاری‌های سلول اپی تلیال و استوانه‌ای در دو روشن مشاهده نشد (جدول ۲).

نتایج به دست آمده از لامهای کارنویز مبنی بر وجود ناهنجاری‌های سلول‌های اپی تلیال و استوانه‌ای به وسیله کولپوسکوپی و بیوپسی تأیید گردیدند (تصاویر ۳ و ۴).

1-Fisher's exact Test

2-Chi-square test


3-Independent sample t- test

مقایسه قرار گرفتند. آزمون‌های آماری مورد استفاده در این پژوهش شامل؛ دقیق فیشر^(۱)، مجذور کای^(۲) و آزمون تی مستقل^(۳) می‌باشد.


یافته‌ها

در این مطالعه از ۴۵۰ لام تهیه شده از سلول‌های گردن رحم ۴۱۰ لام دارای کفایت سلولی لازم جهت مطالعه بودند و بقیه لام‌ها از مطالعه خارج شدند. اطلاعات دموگرافیک واحدهای مورد پژوهش نشان می‌دهد که متوسط سن زنان مراجعه کننده ۳۲/۱۲ سال (۷۹-۱۷) بود، متوسط سن اولین ازدواج ۱۸/۵ سال (۳۸-۱۹) و متوسط سن منارک ۱۱/۹۱ (۱۶-۸) سال بود. متوسط اولین روز آخرین قاعدگی زنان مراجعه کننده ۱۱/۹۰ بود و ۶۴/۶ درصد از زنان دارای قاعدگی طبیعی بودند، تعداد حاملگی، زایمان و سقط به ترتیب؛ ۲/۱۶، ۲/۶۳ و ۰/۴۵ بود.


در این مطالعه کفایت سلولی لام‌ها با حضور سلول‌های سنگفرشی، استوانه‌ای و ناحیه دگرگونی در لامهای کارنویز فیکس و الكل فیکس بررسی شدند. نتایج نشان داد که حضور سلول‌های سنگفرشی و استوانه‌ای در لامهای کارنویز فیکس بیشتر از لامهای الكل فیکس می‌باشد و بر اساس آزمون آماری فیشر این اختلاف معنی‌دار است ($p < 0.001$) که این نتایج نشان می‌دهد، کارنویز قدرت بیشتری در پاک کردن خون از سطح لامها را دارد، اما حضور سلول‌های ناحیه دگرگونی در لامهای کارنویز فیکس و الكل مشابه بود.




تصویر ۳: ضایعات داخلی اپی تلیالی دهانه رحم با درجه بالا در لام الكل فیکس (رنگ آمیزی پاپا نیکولا، بزرگنمایی ۴۰)



تصویر ۱: درصد خونی بودن و وضوح لام الكل فیکس (رنگ آمیزی پاپا نیکولا، بزرگنمایی ۴۰)



تصویر ۴: ضایعات داخلی اپی تلیالی دهانه رحم با درجه بالا در لام کارنویز فیکس (رنگ آمیزی پاپا نیکولا، بزرگنمایی ۴۰)



تصویر ۲: درصد خونی بودن و وضوح لام کارنویز فیکس (رنگ آمیزی پاپا نیکولا، بزرگنمایی ۴۰)

جدول ۱: مقایسه میزان وضوح لام‌های الكل فیکس و کارنویزفیکس

سطح معنی‌داری	جمع			بد			متوسط			خوب			میزان وضوح	روش
	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد		
<۰/۰۰۱	۱۰۰	۲۰۵	۷۰/۷	۱۴۵	۲۹/۳	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	الكل فیکس	
	۱۰۰	۲۰۵	۱	۲	۴۷/۳	۹۷	۵۱/۷	۱۰۶	۱۰۶	۰	۰	۰	کارنویز فیکس	
	۱۰۰	۴۱۰	۳۵/۹	۱۴۷	۲۸/۳	۱۵۷	۲۵/۹	۱۰۶	۱۰۶	۰	۰	۰	جمع	

جدول ۲: مقایسه توزیع نتایج سیتوالوژی در لامهای الكل فیکس و کارنویز فیکس در روش اول و دوم

سطح		جمع کل		کارنویز فیکس		الکل فیکس		روش		نتایج سیتوالوژی	
معنی داری	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	نامهنجاری	طبقه بندی عمومی	
NS*	۵/۹	۲۴	۵/۹	۱۲	۵/۹	۱۲	نامهنجاری	عدم نامهنجاری	طبقه بندی عمومی		
	۹۴/۱	۲۸۶	۹۴/۱	۱۹۳	۹۴/۱	۱۹۳					
	۱۰۰	۴۱۰	۱۰۰	۲۰۵	۱۰۰	۲۰۵	جمع				
NS*	۱/۵	۶	۱	۲	۲	۴	حضور	عدم حضور	نامهنجاری سلول سنگفرشی		
	۹۸/۵	۴۰۴	۹۹	۲۰۳	۹۸	۲۰۱	جمع				
	۱۰۰	۴۱۰	۱۰۰	۲۰۵	۱۰۰	۲۰۵	حضور				
<۰/۰۵	۶۱/۵	۲۵۲	۴۴/۹	۹۲	۳۱/۲	۶۴	حضور	عدم حضور	سلول‌های التهابی		
	۳۸	۱۵۶	۵۵/۱	۱۱۳	۶۷/۸	۱۲۹	حضور				
	۹۹/۵	۴۰۸	۱۰۰	۲۰۵	۹۹	۲۰۳	جمع				
<۰/۰۰۱	۳۴/۶	۱۴۲	۴۴/۱	۹۱	۲۴/۹	۵۱	حضور	عدم حضور	عوامل میکروبی		
	۶۵/۴	۲۶۸	۵۵/۵	۱۱۴	۷۵/۱	۱۵۶	حضور				
	۱۰۰	۴۱۰	۱۰۰	۲۰۵	۱۰۰	۲۰۵	جمع				

*NS:Not Significant

گیرد؟ این سؤالی است که در این تحقیق به جوانب

مختلف آن پرداخته شده است.

در این مطالعه معیارهای کفایت سلولی، حضور سلول‌های سنگفرشی، سلول‌های استوانه‌ای و سلول‌های ناحیه دگرگونی است. توزیع سلول‌های سنگفرشی و استوانه‌ای در لامهایی که به وسیله محلول کارنویز فیکس شده‌اند بیشتر از لامهایی است که در محلول الكل فیکس گردیده‌اند. سرسی و همکاران^(۱) نشان دادند که محلول کارنویز در مقایسه با فرمالین ۱۰ درصد دارای توانایی خوبی در تشخیص ماستسل‌ها در مراحل فیزیولوژیک آندومتر هایپرپلاستیک می‌باشد^(۲). در مطالعه‌ای که به وسیله لاورتی و ایست^(۳) در سیدنی استرالیا انجام شد، کیفیت و حساسیت لامهای لتهیه شده از سلول‌های گردن رحم به روش مرسوم پاپ اسمیر

بحث و نتیجه‌گیری

نمونه‌های خونی تست پاپ اسمیر همواره یکی از مشکلات قدیمی سیتوالوژیست‌ها در مطالعه نمونه‌ها بوده است. این امر موجب شده که تغییراتی در تکنیک‌های مرسوم پاپ اسمیر انجام گردد. استفاده از موادی مانند ساپونین^(۱)، محیط مایع و محلول سیتوفریچ - رد می‌تواند موجب کاهش گلبول‌های قرمز از زمینه نمونه‌ها گردد(۱۲ و ۱۳). بدیهی است استفاده از محلولی که علاوه بر ثابت کردن سلول‌ها، خاصیت پاک نمودن خون از سطح لامهای را نیز داشته باشد جایگاه ویژه‌ای در فناوری مرسوم پاپ اسمیر خواهد داشت و محلول کارنویز به عنوان محلولی شناخته شده در لیز نمودن گلبول‌های قرمز در مراحل مختلف فیکساسیون نمونه‌های پاتولوژی به کار می‌رود. این محلول جهت فیکس نمودن نمونه‌های بافتی پستان، تیروئید، کبد و بافت رحم به کار رفته است. آیا این محلول می‌تواند در پاپ اسمیر مورد استفاده قرار

1-Saponin
2-Cerci et al
3-Laverty & East

می باشد (۱۵). همچنین در مطالعه‌ای که به وسیله لسلی و همکاران^(۲) (۲۰۰۳) جهت بررسی تعیین میزان اسید گلوسیال استیک^(۳) برای پاک کردن نمونه‌های پاپ‌اسمیر به روش تین پرپ انجام شده بود مشاهده شد که کفایت سلولی لام‌هایی که دارای کفایت سلولی لازم نبودند، پس از شسته شدن به وسیله اسید استیک و پاک شدن خون از زمینه لام افزایش یافت، به گونه‌ای که تمام نمونه‌های مورد مطالعه دارای کفایت سلولی لازم شدند و تکرار آزمایش‌ها را به میزان ۴۸ درصد کاهش دادند (۱۶).

این مطالعات و نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می‌دهند که پاک شدن خون از سطح لام‌ها به وسیله محلول‌های لیز کننده گلبول قرمز موجب شناسایی بهتر سلول سنگفرشی، غده‌ای و تاجیه دگرگونی می‌گردد و کفایت سلولی مطلوب‌تری را ایجاد می‌نمایند.

افزایش توزیع سلول‌های التهابی و عوامل میکروبی در لام‌های کارنویز فیکس می‌تواند ناشی از افزایش وضوح لام‌ها و کاهش خون زمینه‌ای باشد. از سویی این فرضیه به ذهن می‌رسد که آیا محلول کارنویز در شناسایی برخی عوامل میکروبی خاص دارای قدرت بالاتری در مقایسه با روش الكل فیکس می‌باشد؟ که با مقایسه کشت سلولی ترشحات دهانه رحم و محلول کارنویز در شناسایی عوامل میکروبی می‌توان پاسخ مناسب به این فرضیه داد.

(الکل فیکس) با لام‌های تهیه شده از سلول‌های گردن رحم به وسیله محلول سیتوریچ رد با یکدیگر مقایسه شدند. او نشان داد که حضور سلول‌های داخل گردن رحم در لام‌هایی که به وسیله سیتوریچ رد فیکس شده بودند، دارای کفایت بهتر و وضوح بیشتر از لام‌های تهیه شده به روش مرسوم پاپ‌اسمیر (الکل درصد) می‌باشد. همچنین عدم کفایت سلولی در لام‌های سیتوریچ رد کمتر از لام‌های تهیه شده به روش مرسوم می‌باشد (۱۴).

نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد که کفایت سلولی و وضوح سلولی در لام‌های کارنویز بهتر از لام‌های الكل فیکس می‌باشد. توزیع سلولی در روش اول مطلوب‌تر بود و این امر ناشی از پاک شدن خون از زمینه لام‌ها به وسیله محلول کارنویز است. این موضوع که آیا فیکسایسیون مجدد لام‌هایی که فاقد کفایت سلولی هستند به وسیله محلول کارنویز می‌توانند موجب افزایش کفایت سلولی لام‌ها شود، می‌تواند مورد توجه قرار گیرد و بررسی جدید را می‌طلبد. مطالعه حاضر همچنین نشان داد که محلول کارنویز به طور قابل توجهی موجب کاهش گلبول‌های قرمز از زمینه لام‌ها و افزایش وضوح لام‌ها می‌گردد و تأثیری بر روی رنگ آمیزی سیتوپلاسم هسته‌ای ندارد و موجب ایجاد چروکیدگی سلولی و تیره شدن هسته سلول‌ها به گونه‌ای که جزئیات هسته را نامعلوم نماید نمی‌گردد.

ویدمن و همکاران^(۱) (۱۹۹۷) نشان دادند که سیتوریچ رد در کاهش گلبول‌های قرمز از سطح لام‌ها در نمونه‌های تهیه شده از بافت‌های مختلف مؤثر

1-Weidmann et al

2-Leslie et al

3-Glacial Acetic Acid

نمونه‌های خونی پاپ اسمیر به روش مرسوم مورد استفاده قرار گیرد. نتایج این تحقیق می‌تواند مورد توجه مسئولین بهداشتی - درمانی قرار گیرد تا از تکرار آزمایش‌های مکرر که موجب هزینه‌هایی برای جامعه و خانواده می‌شوند کاسته شود و از بار کاری پرسنل آزمایشگاهها نیز کاسته شود و در ضمن نتایج پاتولوژی دقیق و صحیح‌تری ارایه شود. پیشنهاد می‌شود این مطالعه در حجم نمونه بالاتری جهت مطالعه ناهنجاری‌های سلول‌های سنگفرشی و استوانه‌ای انجام شود و بهتر است جهت بررسی دقیق بر تأثیر زمان فیکساسیون به وسیله محلول کارنویز بر روی سلول‌های خونی گردن رحم این مطالعه در زمان‌های متفاوت انجام گیرد.

تقدیر و تشکر

نویسندهان مقاوله از زحمات دکتر فرشاد نیلی اصفهانی، دکتر احمد منبئی، صدیقه باغبانباشی، پروین ریاستی، فریده سالم هیم و نرجس طبیبی و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز کمال تشکر و سپاسگزاری را دارند.

در پژوهش حاضر توانایی محلول کارنویز در شناسایی ناهنجاری گردن رحم براساس سیستم بتسد^(۱) به عنوان یافته‌های فرعی پژوهش محسوب می‌شود. این یافته‌ها بر اساس مطالعه طبقه‌بندی عمومی ناهنجاری‌ها و شناسایی ناهنجاری‌های سلول سنگفرشی و غده‌ای براساس فرم سلول‌شناسی انجام یافته است. نتایج این مطالعه بین شناسایی ناهنجاری‌های سلول‌های سنگفرشی و استوانه‌ای در دو روش تفاوت آماری معنی‌داری را نشان نداد. بی‌شایپ^(۲) (۱۹۹۷) نشان داد که محلول سیتوریچ رد می‌تواند حضور سلول‌ها را به صورت مطلوبی نشان دهد و دارای حساسیت بالایی برای ضایعات پیش‌بدهیمی درجه پایین دهانه رحم^(۳) در مقایسه با فن‌آوری مرسوم پاپ اسمیر (الکل ۹۶ درصد) باشد و می‌تواند به عنوان یک روش مکمل برای تشخیص ناهنجاری‌های سلول‌های اپی‌تلیال و استوانه‌ای به کار رود (۱۷). نتایج مطالعه حاضر نشان داد که هر دو روش می‌تواند ضایعات را شناسایی کند، چون کلیه نتایج حاصل شده به وسیله کولپوسکوپی و بیوپسی تأیید شدند.

بر اساس نتایج این مطالعه مشخص شد که محلول کارنویز در فیکساسیون لامهای خونی پاپ اسمیر و لیز نمودن گلبول‌های قرمز از سطح لام‌ها تأثیر مثبتی دارد و موجب افزایش وضوح لام‌ها و شناسایی بهتر سلول‌های سنگفرشی، استوانه‌ای، سلول‌های التهابی و عوامل بیماری‌زا می‌گردد.

در مجموع نتیجه‌گیری می‌شود که محلول کارنویز می‌تواند به عنوان یک فیکساتیو مؤثر در

1-Bethesda

2-Bishop

3-Low Grade Squamous Intraepithelial Cervical Lesions

Comparison of Two Methods of Fixation with Carnoy's Solution and 96% Ethyl Alcohol in Pap Smear Slides

Abdali KH *,
Shamsi M **,
Riyaz Montazer N***,
Tabatabaee HR ****.

* MSc in Midwifery , Department of Midwifery, School of Nursing & Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

** MSc in Midwifery, Lorestan University of Medical Sciences, OB & GYN Hospital of Khoram Abbad, Khoram Abbad , Iran

*** Assistant Professor of Pathology, Department of Pathology, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

**** MSc in Epidemiology, Department of Statistics, Health Faculty, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

KEYWORDS:
Fixation,
Carnoy's,
96% Ethyl alcohol,
Bloody Pap Smear

Received:7/9/1385

Accepted:6/12/1385

Corresponding Authors: Abdali KH
Email: abdali_kh@yahoo.com

ABSTRACT:

Introduction & Objective: Cervical carcinoma is a significant health care problem world wide. The Papanicolaou test is the most common effective tool available for early detection of cervical cancer. Blood could have a negative influence on the quality of the pap smear. Good fixation reduces red blood cells of the background slides and can help to improve this technique. One of the effective solutions for hemolyzing red blood cells is using Carnoys solution. The aim of this study was to compare two methods of fixation with Carnoys solution and 96% ethyl alcohol in bloody pap smear slides.

Material & Methods: This study was done on 450 bloody slides of pap smear prepared from cervical cells of 225 women who referred for annual screening of cervical cancer from 1384 -85 in Zeinabie and Faghihi hospitals in Shiraz. In each case, after observation of contact bleeding, two samples with conventional pap smear method were prepared. In the first method one of the samples was fixed in 96% ethyl alcohol for 5 minute and another sample was fixed with Carnoys solution for 20 minutes. Then the slides were stained with papanicolaou method and were evaluated by two pathologists. Collected data were analyzed with Fishers exact test, Pearson chi – square test and Independent sample T test.

Results: Results of this study showed that presence of squamous cells and glandular cells in Carnoys fixed slides was more than alcohol – fixed slides. The reduction of red blood cells of the background of slides and increase of slide clearance in Carnoys fixed slides were more than alcohol fixed slides. The diagnosis of inflammatory cells and pathogen microorganisms in Carnoys fixed slides were more than alcohol fixed slides but diagnosis of epithelial cells and glandular cells abnormalities in two methods was not statistically significant.

Conclusion: Carnoys stain can be effectively used for proper fixation of Pap smear slides.

REFERENCES:

- 1.Hasanzadeh M, Behtash N. Cervical cancer screening. Cancer therapy J 2005;3:231-6.
- 2.Sadri GH, Mehdizadeh M, Shahidi Sh, Isazi M. Abnormal results of pap smear in women in Isfahan. Journal of Medical Sceinces Research1999; 2:134-5.
- 3.Lockwood R. Characteristics of participation in cervical cancer screening. Cancer Nursing An International Journal of Cancer 2004.27(5):353-63.
- 4.Kenneth GR, Ross SB. Kisner's gynecology & womens health. 7th ed. USA: Mosby; 1999; 100-6.
- 5.Nuovo J, Melnikow J, Howell LP. New tests for cervical cancer screening. America Family Physician 2001; 46(5):780-6.
- 6.Bauer HM, Ting Y, Greer CE, Dunton CJL. Genital human papillomavirus infection in female university students as determined by a PCR-based method. JAMA 1991; 265:472-7.
- 7.Rahnama P, Faghihzadeh S, Ziae S. Effect of the sampling sequence on the ability of papanicolaou smear. Int J Gynecol Cancer 2005;(15):66-9.
- 8.Kadivar C , Robati M, Kadknodaci M , Ghasempour X. Challneges in pap smear screening: A qunlification assessment of provincial health system network. International ymposiumon predictive oncology and international sterategies: 2004 February.7-10: Nice, Ferance
- ۹.صدری غلامحسین، مهدیزاده مرتضی، شهیدی شهلا. ایزدی مینو. نتایج غیرطبیعی پاپ اسمر در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی استان اصفهان سال‌های ۱۳۷۷ - ۱۳۷۶ . مجله پژوهش در علوم پزشکی ۱۳۷۸ . سال ششم، شماره ۲ : ۱۲۴-۱۲۵
- ۱۰.مهدیزاده ابوالفضل، اکبریان عبدالرسول، مغازه‌ای ترانه. بررسی ۳۰۰۰ نمونه پاپ اسمر در زنان متأهل جنوب شهر تهران طی سال‌های ۱۳۷۷-۱۳۷۶. فصلنامه علمی - پژوهشی فیض ۱۳۷۸ . سال سوم، شماره ۱۱ : ۳۲-۳۷
- 11.Hideshein A, Bratli M, Concepcion E, Rober T. Collection of cervical secretions does not adversely affect pap smears. Take immediately after ward. Clinical and Diagnostic of Laboratory Immunology 1998; 5 (4): 491-3.
- 12.Koss LG, Melamed MR. Koss diagnostic cytology and it is histopathologic bases . 5th ed. USA:Elsevier- Churchil Walking Stone ; 2006; 1570-1634.
- 13.Cerci M, Tvil L, Gungor S, Gulec A, Yuncu M. The mast cell in physiological phases of endometrium andcystic hyper plasia with different fixation solution. Turkiye Klinikleri J Med Sci 1998; (18):119-22.
- 14.Laverty C, East W. Evaluation of the cytorich slide preparation. Anal Quant Cytol Histol 1997; 19(3): 239-45.
- 15.Weidmann J, King LC, Bibbo M. Modification of Cytorich-Red fixative system for use on bloody pap and fine needle aspiration smears. Diagnostic Cytopatology J1999; 20(2): 95-8.
- 16.Leslie R , Rowe B , Jole S. A simple method to determine the need for glacial acetic acid treatment of bloody thin prep pap test before slide processing. Diagnostic Cytology J 2003; 5: 321-5.
- 17.Bishop J. Comparison of the CytoRich system with conventional cervical cytology: preliminary Data on 2032 cases from a clinical trail site. Acta Cytol 1997; (41):15-23.