

پاسخ پوستی سمپاتیک در بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپ

چکیده:

مقدمه و هدف: شایعترین درگیری موضعی اعصاب محیطی گیر افتادن عصب مدیان در مچ دست است که سندرم تونل کارپ نامیده می شود. روش‌های معمول الکتروفیزیولوژیک تنها اعصاب میلین دار را بررسی می کنند. پاسخ پوستی سمپاتیک روش اثبات شده ای برای بررسی فیبرهای بدون میلین سمپاتیک است. هدف از این مطالعه ارزیابی درگیری سیستم سمپاتیک از طریق تست پوستی سمپاتیک و بررسی ارتباط آن با دیگر یافته های الکتروفیزیولوژیک در سندرم تونل کارپ می باشد.

مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی - تحلیلی بر روی ۵۴ بیمار مبتلا به سندرم تونل کارپ و ۷۸ فرد سالم مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان حافظ دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۸۲ انجام گرفت. روش نمونه گیری به صورت نمونه در دسترس مبتنی بر هدف بوده است. تستهای الکتروفیزیولوژیک معمول و پاسخ پوستی سمپاتیک به روش استاندارد، در تمام افراد تحت مطالعه انجام گرفت. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS و آزمون آماری تی تحلیل گردید.

یافته ها: میانگین و انحراف معیار تأخیر زمانی پاسخ پوستی سمپاتیک در افراد سالم $25/25 \pm 87/87$ میلی ثانیه و در افراد مبتلا به سندرم تونل کارپ $11/11 \pm 281/13$ میلی ثانیه بود. اختلاف میانگین تأخیر زمانی موج پاسخ پوستی سمپاتیک در افراد مبتلا و گروه سالم معنی دار بود ($p < 0.001$).

نتیجه گیری: فیبرهای بدون میلین سمپاتیک در سندرم تونل کارپ درگیر می گردند و استفاده از پاسخ پوستی سمپاتیک می تواند در کنار سایر روش‌های تشخیصی الکتروفیزیولوژیک به تشخیص این بیماری کمک کند.

واژه های کلیدی: عصب مدیان، پاسخ پوستی سمپاتیک، سندرم تونل کارپ

*دکتر سید مصطفی جزایری شوشتاری

*دکتر محمد رضا عمامد

**دکتر بابک وحدت پور

*متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز،

دانشکده پزشکی، بخش پزشکی فیزیکی و توانبخشی

**متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، استادیار و

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،

بیمارستان آیت الله کاشانی، گروه طب فیزیکی

تاریخ وصول: ۱۳۸۲/۱۰/۲۷

تاریخ پذیرش: ۱۳۸۴/۱/۲۰

مؤلف مسئول: دکتر سید مصطفی جزایری شوشتاری

پست الکترونیکی: jazayeri1335@yahoo.com

مقدمه

دهنده فعالیت غدد عرق اکرین و بافت اپیدرم مجاور

آن است که از طریق فیبرهای بعد گانگلیون بدون میلین سمپاتیک منتقل می‌گردد^[۹].

هدف از این مطالعه ارزیابی درگیری سیستم سمپاتیک از طریق تست پوستی سمپاتیک و بررسی ارتباط آن با دیگر یافته‌های الکتروفیزیولوژیک در سندروم تونل کارپ می‌باشد.

مواد و روش‌ها

این تحقیق به صورت توصیفی - تحلیلی بر روی ۵۴ بیمار مبتلا به سندروم تونل کارپ به عنوان گروه مورد و ۷۸ نفر فرد سالم به عنوان گروه شاهد انجام شد. نمونه‌ها از میان افراد مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان حافظ دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۸۳ انتخاب شد. روش نمونه‌گیری به صورت نمونه در دسترس مبتنی بر هدف بوده است. بیماران انتخاب شده سابقه بیماریهای مؤثر بر روی سیستم خود مختار مثل دیابت و نوروفیزیولوژیک را نداشتند و از داروهای مؤثر بر سیستم خود مختار مثل داروهای ضد فشار خون استفاده نمی‌کردند. تشخیص سندروم تونل کارپ بر اساس وجود عالیم مشخص در شرح حال و معاینه بالینی و همچنین تستهای الکترودیاگنوستیک بود. معیار تشخیصی در تستهای الکترودیاگنوستیک

شايع تري—— درگيری موضعی اعصاب

محیطی در بدن، گیر افتادگی عصب مدیان در مچ دست می‌باشد که سندروم تونل کارپ نام دارد^[۱] و شیوع این سندروم تا ۶/۸ درصد گزارش شده است^[۲]. ظاهر این سندروم به صورت خواب رفتگی، گزگز و درد در ناحیه عصب دهی مدیان در دست است^[۳]. درگیری سیستم سمپاتیک در سندروم تونل کارپ به طور شایعی گزارش شده که شامل افزایش و یا کاهش تعریق می‌باشد^[۴]. کاسیا و همکاران^(۱) (۱۹۹۳) کاهش سطح موج پاسخ پوستی سمپاتیک^(۲) را در افراد مبتلا به سندروم تونل کارپ گزارش نمودند^[۶]، اما تغییر نتایج آنها با توجه به کاهش سطح موج سمت سالم همزمان با سمت مبتلا تفسیر این یافته‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.

تستهای الکتروفیزیولوژیک در تشخیص سندروم تونل کارپ بسیار مفید می‌باشند، به طوری که حساسیت این تستها بین ۴۹ تا ۸۴ درصد و اختصاصی بودن آنها بالای ۹۵ درصد گزارش شده است^[۸ و ۷]. تستهای الکتروفیزیولوژیک معمول تنها فیبرهای عصبی ضخیم میلین دار را ارزیابی می‌کنند و فیبرهای بدون میلین را نمی‌توان از این طریق ارزیابی نمود.

پاسخ پوستی سمپاتیک تست الکتروفیزیولوژیک شناخته شده‌ای است که بخشی از فعالیت سیستم سمپاتیک و فیبرهای بدون میلین نوع سی^(۳) را بررسی نماید. پاسخ پوستی سمپاتیک نشان

1-Caccia etal

2 - Sympathetic Skin Response (SSR)

3- C Fiber

تکرار ثبت و مقادیر زمان تأخیر و ارتفاع موج جهت بررسی در نظر گرفته شد. برای ثبت موج پاسخ پوستی سمپاتیک از دستگاه الکترومیوگراف^(۲) استفاده شد. از الکترودهای سطحی دایره‌ای^(۴) و ژل^(۵) استفاده شد. معیار شدت سندرم تونل کارپ بر اساس زمان تأخیر انتهایی عصب حسی م迪ان^(۶) در نظر گرفته شد، به این صورت که سندرم تونل کارپ خفیف ۴/۵ - ۳/۷، متوسط بین ۶ - ۴/۵ و شدید بیشتر از ۶ تعریف شد [۱۲]. داده‌های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS^(۷) و آزمون آماری تی دانشجویی^(۸) تحلیل گردید.

یافته‌ها

در تست پاسخ پوستی سمپاتیک بر روی اعصاب م迪ان ۷۸ فرد داوطلب سالم مشتمل بر ۲۱ مرد و ۴۷ زن با میانگین و انحراف معیار سن $5/6 \pm 39/4$ سال، میانگین و انحراف معیار تأخیر زمانی شروع موج منفی $87/25 \pm 10/5$ میلی ثانیه و ارتفاع موج $1/64 \pm 10/5$ میلی ولت بود که این مقدار برای دست راست $87/85 \pm 1498/46$ میلی

-
- 1- Palmaris longus
 - 2 - Flexor carpi radialis
 - 3- TOENNIES Multiliner Version 2.0
 - 4- Lomm diameter stainless steel surface electrodes
 - 5- Gel- salt free
 - 6- Distal Latency (DL)
 - 7- Statistical Package for Social Sciences
 - 8- Student T -test

به صورت وجود همزمان تأخیر پاسخ برانگیخته موج حسی عصب م迪ان در فاصله ۱۴ سانتیمتر بیشتر از ۳/۷ میلی ثانیه، تأخیر پاسخ برانگیخته موج موتور عصب م迪ان در فاصله ۸ سانتی متر بیشتر از ۴/۲ میلی ثانیه و کاهش سرعت هدایت عصبی در ناحیه مچ به میزان کمتر از ۴۰ متر در ثانیه در نظر گرفته شد [۱۱ و ۱۰]. دمای پوست بیمار به وسیله دماسنج الکترونیک قبل و پس از انجام تست کنترل و بالای ۳۴ درجه حفظ شد. از افراد سالم نیز تستهای تشخیصی سندرم تونل کارپ برای رد موارد تحت بالینی انجام گرفت.

برای انجام تست پاسخ پوستی سمپاتیک بیمار به طور راحت بر روی تخت به پشت خوابیده و به بیمار اجازه استراحت به مدت حداقل ده دقیقه داده شد. تست پاسخ پوستی سمپاتیک در نور کم و در محل ساکت انجام گرفت. قبل از انجام تست در مرور دنحوه انجام این تست به بیمار توضیح داده شد و سپس الکترود فعال در کف دست بین پرده بین انگشتی دوم و سوم و الکترود مرجع بر روی انگشت سوم قرار داده شد، الکترود گراند بر روی مچ دست قرار داده شد. تحریک در سه سانتی متری خط دیستال مچ دست بین تاندونهای عضلات پالماریس لونگوس^(۹) و فلکسور کارپی رادیالیس^(۱۰) داده شد و از امواج قائم الزاویه با طول مدت ۱/ میلی ثانیه و شدت ۱۰ میلی آمپر استفاده شد. شدت تحریک به تدریج افزوده می شد و فواصل بین انجام تحریکات حداقل ۳۰ ثانیه بود. مقادیر پنج موج قابل

در افراد سالم میانگین و انحراف معیار

ارتفاع موج بر حسب اختلاف قله به قله موج در هر دو

دست $1/0.5 \pm 1/6.4$ میلی ولت بود. این مقدار برای

افراد مبتلا به سندروم تونل کارپ $\pm 1/0.8 \pm 1/4.6$

میلی ولت بود که از نظر آماری معنی دار نبود.

موج پاسخ پوستی سمپاتیک در دستهای

تمام افراد سالم وجود داشت، اما در پنج دست (۵/۵)

درصد) مبتلا به سندروم تونل کارپ این موج به دست

نیامد.

بحث و نتیجه گیری

در حال حاضر بهترین تست تشخیصی

برای بررسی درگیری عصب مدیان در تونل کارپ بر

پایه تستهای معمول الکتروفیزیولوژیک است، اما

حساسیت و اختصاصی بودن این تستها، کامل نیست

و استفاده از سایر روش‌های تشخیصی همزمان

می‌تواند تشخیص سندروم تونل کارپ را با اطمینان

بیشتری نشان دهد. تست پاسخ پوستی سمپاتیک

تست شناخته شده‌ای است که برای ارزیابی فیبرهای

بدون میلین از طریق انتهای عصبی کولینرژیک غدد

عروق به کار می‌رود [۹].

امینوف^(۱) (۱۹۷۹) به وسیله پلتیسموگرافی

نشان داد که در ۵ بیمار از ۱۳ بیمار مبتلا به سندروم

تونل کارپ پاسخ انقباض عروقی انگشتان نشانه از

میلی ثانیه و برای دست چپ $87/61 \pm 150.6/0.2$

میلی ثانیه بود.

از ۵۴ بیمار مبتلا به سندروم تونل کارپ که

بر اساس یافته‌های معمول الکتروفیزیولوژیک نیز

ارزیابی شده بودند، ۹۱ دست مبتلا به این سندروم بود

که ۳۷ نفر هر دو دست 15.5 نفر فقط دست راست و دو

نفر فقط دست چپ مبتلا بود. در کل ۵۲ دست راست و

۳۹ دست چپ به این سندروم مبتلا بود.

میانگین و انحراف معیار تأخیر زمانی موج

منفی پاسخ پوستی سمپاتیک دست راست افراد مبتلا

$16.37/11 \pm 28.1/13$ میلی ثانیه و تأخیر

زمانی موج منفی پاسخ پوستی سمپاتیک دست

چپ مبتلا $25.6/7.6 \pm 16.5/0.58$ میلی ثانیه بود. این

مقادیر برای هر دو دست مورد مبتلا

$16.43/7.8 \pm 26.8/1$ میلی ثانیه بود.

اختلاف میانگین تأخیر زمانی شروع موج

پاسخ پوستی سمپاتیک در دست راست مبتلا و چپ

مبتلا و در کل با گروه سالم معنی دار بود و به

p < 0.01 و p < 0.001 ترتیب؛ به میزان

بود (غیر طبیعی بودن پاسخ پوستی سمپاتیک بر

اساس مقدار میانگین به علاوه دو انحراف معیار

شروع موج منفی در نظر گرفته شد). بر اساس شدت

درگیری به ترتیب؛ ۴۲ درصد، ۲۹ درصد و

۲۸/۵ درصد بیماران عالیم الکترودیاگنوستیک

درگیری خفیف متوسط و شدید از این میان به ترتیب؛

۳۵، ۳۲/۵ و ۳۲/۵ درصد بیماران پاسخ پوستی

سمپاتیک غیرطبیعی داشتند.

آنچه که پاسخ پوستی سمپاتیک به وسیله فیبرهای پس گانگلیونی بدون میلین سمپاتیک منتقل می شود و با توجه به این فیبرهای ایجاد کننده انقباض عروقی مجزا می باشد . پس پاسخ پوستی سمپاتیک تنها می تواند عالیم اختلال تعزیری را بررسی نماید.

به طور کلی ارتفاع موج پاسخ پوستی سمپاتیک در افراد مختلف اختلاف زیادی دارد و اگرچه گفته می شود که ارتفاع موج پاسخ پوستی سمپاتیک بستگی به تراکم و یا تعداد عدد عرق فعال دارد، اما در این بررسی اختلاف معنی داری بین گروه مبتلا به سندرم توفل کارپ و گروه کنترل دیده نشد.

در این مطالعه درگیری فیبرهای سمپاتیک در سندرم توفل کارپ به وسیله تست پاسخ پوستی سمپاتیک مورد بررسی قرار گرفت . نتایج این مطالعه بیانگر درگیری فیبرهای سمپاتیک همزمان با درگیری فیبرهای دارای میلین در سندرم توفل کارپ می باشد، به صورتی که هر چه شدت درگیری فیبرهای میلین دار بیشتر باشد شدت درگیری فیبرهای بدون میلین که به وسیله پاسخ پوستی سمپاتیک ارزیابی می گردد، نیز بالاتر است .

تقدیر و تشکر

بدین وسیله از شورای پژوهشی دانشکده پژوهگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز که ما را در انجام این پژوهش یاری کردند—قدردانی و تشکر می گردد.

بین رفته است، ولی در انگشت پنجم حفظ شده است. او پیشنهاد نمود که کاهش پاسخ رفلکس اتونومیک در این بیماران می تواند در تشخیص بالینی مورد توجه قرار گیرد [۱۳].

اغلب عقیده بر این است که فیبرهای عصبی بدون میلین نسبت به فیبرهای میلین دار مقاومت بیشتری در برابر فشار دارند [۱] و فیبرهای عصبی قطور در ضایعات ناشی از فشار به اعصاب به طور انتخابی درگیر می شوند [۱۳]. در بیمارانی که فشار وارده به اعصاب محیطی به طور طولانی مدتی ادامه داشته ، ممکن است عالیم درگیری سیستم اتونوم دیده شود[۱].

در این بررسی اگر معیار غیر طبیعی بودن تست پاسخ پوستی سمپاتیک را تأخیر زمانی شروع موج یا عدم پاسخ تست پاسخ پوستی سمپاتیک از عصب مدیان در نظر گرفته شود و اگر تفاصل این تأخیر را در دو دست معیار غیر طبیعی در نظر گرفته شود و اگر هر دو معیار با هم در نظر گرفته شود به ترتیب؛ ۴۱ درصد، ۴۶ درصد و ۵۸ درصد از بیماران مبتلا به سندرم توفل کارپ که از طریق تستهای متداول الکترومیوگرافی تشخیص داده شدند، تست پاسخ پوستی سمپاتیک غیر طبیعی دارند و نیز در این مطالعه بیمارانی که دارای شدت بیشتری از سندرم توفل کارپ بودند اختلال بیشتری در پاسخ پوستی سمپاتیک نشان می دادند . در صورت آسیب فیبرهای سمپاتیک به علت فشار مداوم ممکن است خشکی پوست و اتساع عروقی ایجاد شود [۱۴] و از

Sympathetic Skin Response in Patients with Carpal Tunnel Syndrome

Jazayeri Shooshtari SM^{*},
Emad MR^{*},
Vahdatpour B^{**}.

*Assistant Professor of Physical Medicine & Rehabilitation, Shiraz University of Medical Sciences

**Assistant Professor of Physical Medicine & Rehabilitation, Isfahan University of Medical sciences

KEYWORDS:

Median nerve,
Sympathetic Skin Response(SSR),
Carpal Tunnel Syndrome(CTS)

Received: 27/10/1383

Accepted: 30/1/1384

Corresponding Author: Jazayeri SM
E-mail:jazayeri1335@yahoo.com

ABSTRACT:

Introduction & Objective: Median nerve entrapment in the wrist is the most common entrapment neuropathy and is called carpal tunnel syndrome (CTS). Conventional electrophysiologic studies evaluate only the myelinated fibers. Sympathetic skin response (SSR) is a well-established test for evaluation of the unmyelinated sympathetic fibers. This study was designed to evaluate the sympathetic fibers in CTS.

Materials & Methods: Fifty four patients with carpal tunnel syndrome and 78 healthy subjects were enrolled in this study. Conventional electrodiagnostic studies and SSR were performed in all the subjects with standard method.

Results: Latency of the SSR in healthy subjects was 1520.21 ± 87.25 ms and 1637.11 ± 281.13 ms in patients.

Conclusion: Unmyelinated sympathetic fibers are involved in CTS and SSR which may, along with other conventional electrophysiologic tests, help in diagnosis of CTS.

REFERENCES:

- [1]Atroshi I, Gummesson C, Johnsson R, et al. Prevalence of carpal tunnel syndrome in general population. JAMA 1999;282:153-158.
- [2]De Krom MCTFM, Kester ADM, Knipschild PG, et al. Risk factors for carpal tunnel syndrome. J Clin Epidemiol 1990; 45:373-376.
- [3] Phalen GS, Reflections on 21 years experience with carpal tunnel syndrome. JAMA 1970; 212: 1365-1367.
- [4]Brown W, Bolton CE. Clinical Electromyography. 2nd ed. Boston-Massachusetts: Butter Worth Heinemann; 1993; 151-61, 229-245, 347-348.
- [5]Gutrecht JA. Sympathetic Skin Response. J of Clinical Neurophysiology 1994; 11:519-524.
- [6]Caccia MR, Calimberti V, Valla PL, et al. Peripheral autonomic involvement in the carpal tunnel syndrome. ACTA Neurol Scand 1993; 88:47-50.
- [7]American Association of Electrodiagnostic Medicine. Practice parameter for electrodiagnostic studies in carpal tunnel syndrome summary statement. Muscle Nerve 1993;16:1390-1391.
- [8]Jablecki CK, Andary MT, So YT, et al. Literature review of the usefulness of nerve conduction studies and electromyography for the evaluation of patients with carpal tunnel syndrome. Muscle nerve 1993; 16:1392-1414.
- [9]Kimura J. Electrodiagnosis in disease of nerve and muscle. 3rd ed. New York : Oxford university press; 2001;114-117.
- [10]Dumitru D. Electrodiagnostic Medicine.2nd ed.Philadelphia:Hanley&Belfus INC;2002;196,1062.
- [11]Imai T,Matsumoto H,Minami R. Asymptomatic ulnar neuropathy in carpal tunnel syndrome.Arch Phys Med Rehab 1990;71: 992-994.
- [12]Kouyoumdjian JA.Carpal tunnel syndrome age,nerve conduction severity and duration of symptomatology.Arq Neuro Psiquiatr 1999;57:504-512.
- [13]Aminoff MJ. Involvement of peripheral vasomotor fiber in carpal tunnel syndrome. J Neurosurg Psychiatry 1979;42: 649-655.
- [14]Tosi A, Morelli R, D, Alessandro R, et al. Carpal tunnel syndrome presenting with ischemic skin lesions. J of American Academy of Dermatology 1993;24:287-290.